




ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Африканская чума свиней!!!

СПЕЦИФИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ НЕТ!!!

Возбудитель



Вирус семейства *Asfarviridae*, рода *Asfivirus*

Может сохраняться на протяжении нескольких месяцев в продуктах свиного происхождения, не подвергнутых термической обработке



Устойчив к влиянию окружающей среды

Пути передачи инфекции



Выделения больных животных



Использование в корм необезвреженных столовых отходов



Механическими переносчиками вируса могут быть птицы, домашние и дикие животные, грызуны, насекомые паразиты

Профилактика



Не допускать свободного выгула свиней на территории населённых пунктов, особенно в лесной зоне



Ежедневно обрабатывать свиней и помещения для их содержания от кровососущих насекомых, постоянно вести борьбу с грызунами



Не использовать не обезвреженные корма животного происхождения



Ограничить связи с неблагополучными территориями

Течение болезни



При молниеносном течении болезни животные гибнут без каких-либо признаков.

При остром течении болезни наблюдаются следующие симптомы

Больные животные большую часть времени лежат, вяло поднимаются и быстро устают

Серьезные или слизисто-гнойные выделения из носа и глаз

Появляется сильная жажда

Одышка

Кашель

Приступы рвоты

Повышенная температура тела - до 40,5-42,0 °C

У больных животных раскручивается хвост

Иногда понос с кровью, чаще запор

Слабость и параличи задних конечностей, шаткая походка

На некоторых участках кожи могут появиться гнойные волдыри, на месте которых образуются струпа и язвы

Смертность, в зависимости от течения, может достигать от 50 до 100%. Переболевшие и оставшиеся в живых животные становятся пожизненными вирусоносителями

Профилактика



Поголовье свиней в очаге заболевания полностью ликвидируют бескровным способом



Трупы свиней, навоз, остатки корма, малощенные предметы ухода, строения сжигают, золу закапывают в ямы, смешивая её с известью!



Помещения и территории ферм дезинфицируют горячим

3% раствором едкого натрия и 2% раствором формальдегида



На расстоянии 10 км вокруг неблагополучного пункта всё свиноголовое убивают!



Карантин снимают через 6 месяцев с момента последнего случая падежа, а разведение свиней разрешают не ранее, чем через год после снятия карантина